

# Diagnose:

- skel. Tiefbiss Tendenz
- skel. KI II
- KI II/1 – Syndrom (1 PD bds.)
- Overbite 2 mm
- Overjet 6mm mit Sauglippe
- OK – Front negativ anguliert und geflärt

# Behandlungsplan:

Vorerst mit entsprechendem KB und abnehmbarem FKO – Gerät (Fränkel II) den Unterkiefer Schritt für Schritt nach vorne konditionieren mit gleichzeitiger Bisshebung.

Dies ist bei guter Mitarbeit möglich. Den Rest dann feststehend nach Zwischenanalyse und neuerlichen Besprechung mit neuem Kostenvoranschlag.

Vor FKO



Vor FKO



Vor FKO



# Konstruktionsbiss für Fränkelgerät



## Fränkel im Mund



Nach FKO, vor KFO



# Nach FKO, Vor KFO



Nach FKO, Vor KFO





Während KFO

Behandlungsdauer mit Bracketts: 2012-09 bis 2014-06



Nach KFO



# Nach KFO



Nach KFO



Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO



Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO



Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO



Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO





Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO



Vor FKO



Nach FKO, Vor KFO



Nach KFO



Vor FKO

Nach FKO, Vor KFO

Nach KFO



2007-01 before FKO

2012-09 before KFO

2015-02 after KFO